

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO? - 15

Luxación traumática de codo

Páramo Rodríguez E¹

¹ Médico de Familia. Urgencias. HGB de Motril (Granada)

Varón de 40 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés ni alergias conocidas, que acude al SUE del Hospital con dolor a nivel del codo derecho e impotencia funcional, tras la caída desde la rama de un árbol con apoyo del brazo en hiperextensión.

En la exploración física se aprecia deformidad a nivel del codo derecho con limitación para la movilidad activa y pasiva sin afectación nerviosa ni vascular.



A. A la vista de la radiología ¿Cuál sería su diagnóstico inicial y tratamiento a realizar?

1. Luxación anterior de codo. Reducción abierta bajo anestesia. Férula posterior a 90°.
2. Luxación anterior de codo. Reducción cerrada bajo analgesia y sedación. Férula posterior a 90°.
3. Luxación posterior de codo. Reducción abierta bajo anestesia. Férula posterior a 90°.
4. Luxación posterior de codo. Reducción cerrada bajo analgesia y sedación. Férula posterior a 90°.

B. ¿Qué exploraciones le parecen más importantes a llevar a cabo en el paciente para prevenir posteriores complicaciones?

1. Exploración radiológica.
2. Exploración vascular del miembro afecto.
3. Exploración neurológica del miembro afecto.
4. Todas las anteriores.

(Respuestas razonadas en el próximo número)
Remitir las respuestas al correo electrónico: revista@samfyc.es
o a: **Revista Medicina de Familia. Andalucía**
¿Cuál es su diagnóstico?
Calle Arriola 4, bajo - 18001 Granada