

Comentarios a  
**CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO**  
 (del Vol. 21, Núm. 3)  
 (Med fam Andal 2020; 21: 203-204)

## Respuestas razonadas

Fiebre y somnolencia en paciente octogenario

Recibido el 10-08-2020; aceptado para publicación el 22-09-2020

Rodríguez Cerro M<sup>1</sup>, Vallejo Somohano F<sup>1</sup>,  
 Gargantilla Madera P<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Medicina de Familia y Comunitaria,  
 Hospital de El Escorial. Madrid

<sup>2</sup>Medicina Interna, Hospital de El Escorial. Madrid

### Pregunta 1:

- Coxiella burnetii*: agente causal de la Fiebre Q que se contagia por inhalación de manera habitual y no por vectores. La clínica más frecuente es un cuadro gripal y NO produce exantemas. En más del 50% aparece clínica neumónica. Otras afectaciones son hepatitis granulomatosa y endocarditis.
- Rickettsia typhi*: causante del tifus murino o endémico, se transmite por las pulgas de las ratas, la *Xenopsylla cheopis* o más raramente *Ctenocephalides felis*. Los principales síntomas son cefalea, fiebre (de más de dos semanas), escalofríos, dolores articulares o artralgias, náuseas, vómitos, tos, dolores abdominales y en la columna vertebral. También suele provocar la aparición de exantema.
- Rickettsia conorii* (**respuesta correcta**): agente causal de la FBM cuyo reservorio es el perro y el vector la garrapata *Rhipicephalus sanguineus*. Su clínica principal es fiebre + artralgias. En el lugar de la picadura aparece una lesión inicial vesiculosa y necrótica conocida como mancha negra. Tras el inicio de la fiebre a los 3-4 días aparece un exantema pruriginoso palmo-plantar.
- Bartonella henselae*: causante de la enfermedad por arañazo de gato, se trata de una infección local, generalmente una adenopatía, de curación espontánea en relación con una mordedura o arañazo de gato.

### Pregunta 2:

- Amoxicilina 500 mg/8h 14-21 días: tratamiento de elección para numerosas patologías infecciosas, así como, sinusitis, OMA, amigdalitis, neumonía, pielonefritis, enfermedad de Lyme...
- Doxicilina 100 mg/12h 10 días* (**respuesta correcta**)
- Ceftriaxona 2g/24h iv: tratamiento de elección de infección por gonococo
- Penicilina G benzatina 2.4 MUI: tratamiento de elección de la sífilis

### Bibliografía

- Segura Porta F, Font Creus B. Fiebre botonosa mediterránea y otras infecciones causadas por rickettsias. Fiebre Q. En: Farreras P, Rozman C. Medicina Interna. 17º ed. Barcelona: Elsevier; 2012.p.2107-2114.
- Guerrero A, Gimeno F, Colomina J, Molina M, Oteo JA, Cuenca M. Low incidence of tick-borne rickettsiosis in a Spanish Mediterranean area. Ann N Y Acad Sci. 2006; 1078(1):200-202.

**Dirección para correspondencia:**  
 Alberto Ibáñez Navarro  
 E-mail: aibanez021@gmail.com